



STEVENSON MYCOLOGICAL LIBRARY
Smithsonian Institution



L.3/31 ✓

John afternoon




QK
585
CGA76
1888
SCN4RB

Arnold

Chadwick

Y09



Herbar. Floerke in Rostock.

1269 — *Cladonia straminea* Som., Fl. Comm. p. 87

(Specim. orig. Sommerfeltii.)

DBI

Y 557.551.1 J / 5000.1058M
403 B3A207.7 B1166



Cenomyce Degenerans

var. *dichotoma*. H.

See Nelson's book on the subject.

Capitularia degenerans.

lit. K. Flok. apud
Web. et in obr. Beyt.

II. p. 318. (excl. synn.)

Herbar. Floerke in Rostock.

1264 — *Cladonia degenerans* Fl. g. *dichotoma* Fl. Comm. p. 46.
(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.


1265 — *Cladonia costata* Fl. Comm. p. 67 obs. 2: podetia subuliformia
hujus varietatis rarissima sunt.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1267 --- *Cladonia chlorophaea* L., *pyx. f. lepidophora* Fl. Comm. p. 75.
(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.


— *Cladonia ochrochlora* Fl.

1268

1268 sup.: *c. nana* Fl. Comm. p. 79.

1268 inf.: *e. paraphyomena* Fl. Comm. p. 78.


(Specim. orig. Fl.)



Icones 1263—1356 a L. Obernetter in München,
adjuvante sole [Lichtdruck, Heliotypie] praeparatae, lente
vitrea circa 12 centim. lata adspiciendae sunt.

Herbar. Floerke in Rostock.

1263 -- *Cladonia degenerans* Fl. d. trachyna Ach., Fl. Comm. p. 44,
(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1270 — *Cladonia Floerkeana* Fr. b. *leucophylla* Fl. Comm. p. 101.


(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1271 — *Cladonia turgida* Hoff. b. *corniculata* Som., Fl. Comm. p. 118.

(Specim. orig. Sommerfeltii.)



Die fruchttragende Pflanze
wird in der Form einer kleinen
Kugel in der Erde untergebracht
in der sie sich zu entwickeln
beginnt.




Cladonia amara
var. *myrica* L.

Herbar. Floerke in Rostock.

1272 — *Cladonia amaurocr. c. myriocraea* Fl. Comm. p. 124.


(Specim. orig. Sommerfeltii.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1273— *Cladonia cenotea* Ach. b. *viminalis* Fl. Comm. p. 128.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1274 --- *Cladonia squamosa* Hoff. b. *asperella* Fl. Comm. p. 132.

(Specim. orig. Fl.)



III. *Penicillium* *ficicola* var.
crispata forma 2.

(*Penicillium* *crispata* forma 2. H.

Penicillium *crispata* forma 2. H.

Penicillium *crispata* forma 2. H.




Herbar. Floerke in Rostock.

1275— *Cladonia squamosa* H. b. *multibrachiata* Fl. Comm. p. 133.

1275 sup.: specim. Flotowii.

1275 inf.: specim. Laureri.



(Specim. orig.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1276 --- *Cladonia squamosa* H. c. *lactea* Fl. Comm. p. 134.

(Specim. orig, Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1277— *Cladonia squamosa lactea* b. *tenellula* Fl. Comm. p. 135.


(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1278— *Cladonia squamosa* H. d. *polychonia* Fl. Comm. p. 136.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1279 — *Cladonia squamosa* d. *polychonia* Fl. Comm. p. 136: „junge Ex.
Bernstorfer Tanne, Mai 1828.“


(Specim, orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1280 — *Cladonia squamosa* H. b. *ferulacea* Fl. Comm. p. 137: „Rostocker Heide 1827.“


(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1281— *Cladonia glauca* Fl. Comm. p. 140.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1282— *Cladonia furcata* Hds.

1282 dextr.: *b. tenuissima* Fl. Comm. p. 143.

1282 sin.: *e. truncata* Fl. Comm. p. 145.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1283 — *Cladonia furcata* Hds. f. *dichotoma* Fl. Comm. p. 148 Obs.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1284 — *Cladonia furcata crispata* Ach. b. *blastica* Ach., Fl. Comm.
p. 150.


(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1285— *Cladonia furcata* Hds. subvar. *Arbuscula* Fl. Comm. p. 152.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1286 — *Cladonia rangif.* L.

1286 dext.: var. *grandaeva* Fl. Comm. p. 162.

1286 sin.: c. *sphagnoides* Fl. Comm. 168,

(Specim. orig. Fl.)

Cladon. rangiferina.
B. incrassata. Schær.
Spirit. p. 38.




1287 — *Cladonia rangif.* L.

1287 dext.: *incrassata* Schaer., Fl. Comm. p. 163.

1287 sin.: *b. polycarpia* Fl. Comm. p. 168.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1288 — *Cladonia rangif. c. decumbens* Fl. Comm. p. 165.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1289 — *Cladonia rangif. b. spumosa* Fl. Comm. p. 166.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.

1290. — *Cladonia rangif. d. grandis* Fl. Comm. p. 169.

(Specim. orig. Fl.)



Herbar. Floerke in Rostock.


1291— *Cladonia rangif. e. erosa* Fl. Comm. p. 169.

(Specim. orig. Laureri.)




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1292--- *P. fusca*: „symphycarpa, defl. anablastemat.“ (W. in herb.) Wallr.
S. p. 121. *Clad. foliosa* Stt. in Floerke Comm. p. 17 (sec. specimen
in Herb. Fl.) = *macrophylla* Schaer.
Ex bryetis montis Achtermannshoehe.



En 1292



1293— *P. fusca*: *decipiens* W. S. p. 122, germ. p. 399 (b. *mixta*): *macrostelis* W. S. p. 122 (sec. *descript.* 1. c.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1294 — *P. fusca*: turbin.: *A. proboscid. mstr. reduncum* W. S. p. 125
(determ. Wallr. in herb.)
Ex pinetis Clausthaliensibus.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1295

— *P. fusca*: turb. W. S. p. 123: „proboscid. b. mstr. ramosum“
(determ. W. in herb.)

In collibus prope Schierke.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1296




P. fusca: turb.: W. S. p. 123: „f. tubaef., monstra peritheta,
ramosa“ (W. in herb.)

Ex campis alpestribus prope Schierke.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1297 — *P. fusca*: *turbinata*: „*m. platythetum*“ (W. in herb.); *m. platy-*
dactylum W. S. p. 126, 93.
Ex pinetis hercynicis.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1298— *P. fusca*: turb.: „mstr. inconditum“ W. S. p. 126; (determ.
Wallr. in herb.)

Ex Bructero monte.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1300 — *P. fusca*, pyxid. A. degen. mstr. phyllocephalum W. S. p. 130
(sec. descript. l. c.)



1301


— *P. fusca*: *macilenta* W. S. p. 131 (sec. descr.); „*L. cornutus*
Auct.; *F. holophyll.* *ceratost.*, *gonim. erasae*, *simplic. et proliferae*,
proliferat. perithetis“ (W. in herb.)

Ex nemore breitensteinensi.






Herbar. Wallroth in Strassburg.

1302 — *P. fusca: fibularis* W. S. p. 131 mstr. *proliferum polycephalum*;
(sec. descript. l. c.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1303 — *P. fusca*: *fibularis*: mstr. *proliferum*, *polycephalum* W. S. p.
132; (sec. descript. 1. c.)





Herbar. Wallroth in Strassburg.

- 1304** — *P. fusca*: cornuta: lus. anablastematicus W. S. p. 133; „F. holophyll., ceratost., basi periblast., prolif.“ (W. in herb.)
Ex ericetis breitungensibus.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1305 — *P. fusca*: *cornuta*: „*defl. scoparius ex natura*“ (W. in herb.);
mstr. *scopar.* W. S. p. 134. germ. p. 405.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1306 : — *P. fusca*: cornuta: „defl. scoparius ex lusu“ (W. in herb.); mstr.
scoparium Wallr. S. p. 134, germ. p. 405.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1307 — *P. fusca*: cornuta: „defl. arbusculaeformis“ (Wallr. in herb.); mstr.
arbusc. W. S. p. 134, germ. p. 405 (prolif.)




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1308 — *P. fusca*: cornuta W.: macrostelis: „mstr. junceum“ (determin.
Wallr. in herb.)




1309 — P. fusca: fimbriata: „fimbr. proboscideus prolifer“ (Wallr. in herb.); W. S. p. 135.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1310 — *P. fusca*: *fimbriata*: mstr. *perithetum* W. S. p. 136 (sec. descript. 1. c.)



1311 — *P. fusca*: tubaeformis: leptost. mstr. heterodactylum W. S. p.
138 (sec. descript. l. c.)

1311 sup.: „ defl. fimbriatus“ (Wallr. in herb.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1312


— *P. fusca*: tubaeformis W. S. p. 137; mstr. homodactylum W. S. p. 139: proles 1—6 ordine variae; „proliferat. lomatothetis 1—7“ (W. in herb.)

Ex promont. saxosis stolbergensibus.



Herbar. Wallroth in Strassburg.



1314 — *P. fusca*: subulata Wallr. S. p. 141: c. platystelis; (sec. descript. l. c.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1315 — *P. fusca*: subulata; „defl. strictus, macrostelis, anablastemat.“
(determin. Wallr. in herb.) Wallr. S. p. 141, germ. p. 421, Schaer,
En. p. 202.

Ex promontoriis Heringensibus.



1316 — *P. fusca*: subulata: „defl. craticius, ramis tortuosis, phaeotrop.“
(determin. Wallr. in herb.); Wallr. S. p. 142, germ. p. 421.

Ex promontoriis Northusanis.




1317 — *P. fusca*: subulata: „c. craticia, monstra prolifera“ (determin.
Wallr. in herb.); W. S. p. 142: proliferum.

Ex promontoriis Northusanis.






- 1318.** — *P. fusca*; *racemosa* W. S. p. 142, germ. p. 422:
„*fructicosus, leptostel., divaricatus*“ (determ. W. in herb.).
In campis apricis circa Birkenmoor.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1319 — *P. fusca: racemosa* W. S. p. 142, germ. p. 422 (determ. Wallr.)
In promont. Stolbergens.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1320 — *P. fusca: racemosa* W. S. p. 142; „monstra anablastematica“
(determin. W. in herb.)



In pinetis Elendens. Hercyn.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


- 1321.** — *P. fusca*: *myosuroides* Wallr. S. p. 149, germ. p. 409: b. *macrostelis*. — „*F. schizophyll. ceratost., periblastematicae, „simplic. et proliferæ“*: „*myosuroides*“ (W. in herb.).

Ex terra nemoris heringens.



X

- 1323.** — *P. fusca*: *caespitosa*: *lus. squamosus*: *A. proboscideus*
W. S. p. 151, germ. p. 410. — „*P. caespitosae deflexus*
„*probosc.* W. S. 151, ad Dillen. hist. L. t. XVI. 22, H.“
(Wallr. in herb.).
-




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1324

— *P. fusca*: caesp. squam. **W.S.** p. 150; germ. p. 410; ad terram
mont. alpestr., in quibus locis bl. phylla eximie luxuriant; comp.
var. squamosissima Fl.


In Bructero Hercyn. monte.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1325 — *P. fusca*: caesp. squam.: „leptostel., mstr. polydactylum“ (W.
in herb.) heterod. polyd. W. S. p. 151.

In nemoribus Breitensteinensibus.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1326 — *P. fusca*: *pyxioides* W. S. p. 152: *lus. anablastematicus* p. 153
(sec. descript.)




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1327 — *P. fusca*: *pyxioides* W. S. p. 152: *lus. decorticatus* p. 153
(sec. descript.); comp. f. *lepidophora* Fl. Comm. p, 75; Arn. 1267.





Herbar. Wallroth in Strassburg.

1328 — *P. fusca: pyxioides* W. S. p. 152: b. verruc., mstr. homodact.
cymatoph. (sec. descript. l. c. p. 154).



1329 — *P. fusca*; *pyxioides* **W.** S. p. 153, germ. p. 411; *b. verruc.*
mstr. platydactylum **W.** S. p. 154 (sec. descript. l. c.)



1330 — *P. fusca: rostrata* W. S. p. 155, germ. p. 412: *leptost., acutus.*
simplex (sec. descript. l. c.) — *comp. g. tenuis* W. S. p. 154.




— P. fusca: rostrata W. S. p. 155.

1331

1331 sup: leptost., acut., simplex: p. 155.

1331 inf.: „F. schizophyll., ceratostel., basi leioplacin., apice
gonimicae, simplic. et prolif.; defl. bifurcus“ (W. in herb.)

In promont. muscos. Stolberg.




— P. fusca: rostrata W. S. p. 155, germ. p. 412: „F. schizophyll., ceratostel., apice gonimico-erasae, simplic. et prolif.“

1332 (Wallr. in herb.)

1332 sup.: „defl. pectinatus“ (W. in herb.)

1332 inf.: „defl. scoparius“ (W. in herb.)

In terra nemorum heringensium.



1333 — *P. fusca*: *rostrata* W. S. p. 155, germ. p. 412: *lus. obtusus* a. *simplex* (sec. *descript.* l. c.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1335 — *P. fusca*: *rostrata* W. S. p. 155: *macrost. ceranoides* (sec. descript. 1. c.)






Herbar. Wallroth in Strassburg.

1336 — *P. fusca*: *ambigua* Wallr. S. p. 156, germ. p. 412; *macrostelis*,
cymatiis saepe maximis (sec. *descript.* l. c.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1337 — *P. fusca*: *ambigua* Wallr. S. p. 156, germ. p. 412: *macrost. b. tubaeformis* (sec. *descript. l. c.*)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1339 — *P. fusca: furcata* W. S. p. 158: „a. stricta, continua, in macrost. tendens“ (Wallr. in herb.)

In promontor. Heringensibus.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


1340 — *P. fusca: furcata* W. S. p. 158: „fruticosa, continua, demum
phaeotropa“ (determin. Wallr. in herb.)

In promont. sylvestr. breitenstein.




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1341 — *P. fusca: furcata* W. S. p. 158: „*fruticosus platystelis*“ (W.
in herb.).



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1342 — *P. fusca: furcata* W. S. p. 158, germ. p. 426: *lus. chnaumaticus*
W. (sec. descript, 1. c.) „*P. f. furc.*“ (W. in herb.)




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1343 — *P. fusca*; *furcata* W. S. p. 158, germ. p. 426: „b. *anablastematicus*“ (determin. W. in herb.)



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1345 — *P. fusca: sylvatica: lus. mixtus* W. S. p. 160: stratum interius
corneum denudatum (sec. descript. l. c.)





Herbar. Wallroth in Strassburg.

1346 . P. fusca; sylvatica W. S. 160, germ. p. 427: b. defl. dilatatus,
„Dill. t. 29, E“ (W. in herb.)




Herbar. Wallroth in Strassburg.

1347 — *P. fusca*: neglecta. W. S. p. 164, germ. p. 403 (sec. descript.
l. c.); comp. Nyl. syn. p. 191.



- 1348** — *P. fusca*: *Arbuscula* W. S. p. 169, germ. p. 425 (sec. specimina
a Wallr. determinata): „Pat. foliac. v. *Arbusc.* „Nordhausen;“ —
„Pat. *Arbusc.*, cr. 425“ (W. in herb.)
-



Herbar. Wallroth in Strassburg.

— *P. coccin.*: subuliformis W. S. p. 174, germ. p. 416: „subuliformis“ (W. in herb.); „*C. bellid. v. gracilentata* Ach.“ (W. in herb.)

1349

1349 sup.: subulif.

1349 inf.: „mega-leptostel., proboscid.“ (W. in herb.: pars superior plantae depictae.

In pinetis ad. mont. Achtermannshoehe, Hercyn.



Herbar. Wallroth in Strassburg.


- 1351** — *P. coccin.*, polyceph.; *A. probosc.*, m. *platydactylum* W. S. p.
176; — („m. prolif. platythes.“ W. in herb.)
Ex pinetis montis Achtermannshoehe, Hercyn.
-



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1352 — *P. coccin. polyceph. A. proboscid.*: „m. perithetum“ (Wallr. in herb.); W. S. p. 176.

Ex Bructero Hercyn. monte.



Herbar. Wallroth in Strassburg.

1353

— *P. coccinea*; def. camp. mstr. inconditum W. S. p. 184; C.
digit. var. „monstrosa“ Ach. (W. in herb.)
Ex arbor. truncis nemoris Stolberg.



Patellaria sulfurea W.

Inter muscos p. Wernigeroden.

1354




Herbar. Wallroth in Strassburg.

— *P. sulfurea* W. S. p. 187, germ. 413.



Herbar. Wallroth in Strassburg.



1356 — *P. cocc. phaeoc. g. squarrosa* W. S. p. 191, germ. p. 429:
(sec. determin. Wallr.)



— *Cladonia rangiferina* L.




1412 sup.: f. *incrassata* Schaer. En. p. 203, Fl. Comm. p.
163; Arn. 1287 dext.

1412 inf.: f. *fissa* Fl. in Schaer. En. p. 203.
(specimina *Schaereri*.)




Herb. v. Naegeli in München.

1413 — *Cladonia cenotea* Ach. f. *monstrosa* Schaer. En. p. 198.
(specimen Schaereri.)



Herb. Floerke in Rostock.

1414 — *Cladonia degenerans* Fl. f. *cladomorpha* Fl. Comm. p. 46:
„Dill. t. 14 f. 12 B: Petersdorf, Novbr. 1823“; — Arn. 1264.



Cladonia pityrea
var. *cladomorphica*

Sill. f. 14. f. 12 B.

Sill. f. 14. f. 12 B.
Sill. f. 14. f. 12 B.
Sill. f. 14. f. 12 B.
Sill. f. 14. f. 12 B.
Sill. f. 14. f. 12 B.

Desm. Desf. Desf. Desf. Desf. Desf.

Herb. Floerke in Rostock.

1417 — *Cladonia pityrea* Fl. f. *cladomorpha* Fl. Comm. p. 81.
(spec. orig. Floerkei.)

Penstemon laevigata
E. *subulata*



Herb. Floerke in Rostock.

1419 -- *Cladonia furcata* v. *subulata* Fl. Comm. p. 143.

(spec. orig. Floerkei.)



avicular 2 fls
v. myrsella H.

Herb. Floerke in Rostock.


1420 — *Cladonia furc. f. subulata*; Fl. Comm. p. 143: *accedens ad f. cymosellam*.

(spec. orig. Floerkei.)



Herb. Floerke in Rostock.

1423 — *Cladonia furc. f. spadicca* Pers., Fl. Comm. p. 146.
(spec. orig. Floerkei.)



Herb. Floerke in Rostock.

1424 — *Cladonia furc. f. recurva*: Fl. Comm. p. 147; — comp. Arn.
1316, 1317.

(spec. orig. Floerkei.)



Herb. Floerke in Rostock.

1427 — *Cladonia furc. f. racemosella* Fl. Comm. p. 152.

(spec. orig. Floerkei.)



29
A.



29 B.

Herb. v. Flotow in Berlin.

— Clad. fimbriata L.

1450

1450 sin.; capreolata Flot. D. L. 29 A. (non capr. Floerke, Arn. 1266).

1450 dext.: fruticulosa Flot. D. L. 29 B; (frutic. Floerke Comm. p. 74 pro parte maxima ad C. glaucam Fl. pertinet: Wainio Clad. p. 490). Apud Flot. 29 B. Clad. fimbr. f. fibula Hoff. praevalet.



27. C.



27. D.

— Clad. chlorophaea L.

1451

1451 sup.: 2. procerior Flot. D. L. 27 C.

1451 inf.: proc. centralis Flot. D. L. 27 D.

Flot. siles. 1849 p. 34: (specimina originalia).



27. C.



27. D.


— Clad. chlorophaea L.

1451

1451 sup.: 2. procerior Flot. D. L. 27 C.

1451 inf.: proc. centralis Flot. D. L. 27 D.

Flot. siles. 1849 p. 34: (specimina originalia).



Cladonia ochroleuca
albescens

H. M. M. M. M. M.


Herb. v. Flotow in Berlin.

1453 — Clad. ochrochlora Fl., II. albescens Flot. Flora 1836 Beibl. p.
47. siles. 1849 p. 35.

(dext., sin.: specimina orig., 1. Oct. 1835 lecta.)

Cladonia straminea Lenz.

mein einziges Exemplar.
Insektivore nms *Cl. bellidiflora* ochrocar-
pa — sehr schön für mollen. Im Beginn ist
immer aber so gut. Apogonien. Kinder
als *Cl. carniopetala*. 17/8 1832.
Fw. Herb.



Cladonia crenulata

forma palmata Fw.

Analog der *Cl. corticifera*, palmata Fw.


Grüngeländer, auf dem Felsen.

11/2 36.

1454

sin.: Clad. straminea (Smft.?) Flot. Lich. sil. 1849 p. 36, Koerb.
syst. p. 26, Wainio Clad. p. 211.

dext.: C. deformis L. f. palmata Flot.; — comp. homodact. Wallr.
S. p. 185; ic. Dietrich t. 117 fig. e; — marginalis Schaer.
En. p. 188.



30 C. *Cladonia uncinata* Hoffm.
var. *subglabra* Fw.


— Clad. cenotea Ach.

1455


1455 sin.: macrostelis Flot. D. L. 30 B.

1455 dext.; subcontinua Flot. D. L. 30 C.

Flot. siles. 1849 p. 39 (specimina originalia).



31. A.



31. B.

31. *Cladonia*

30. *Cladonia crispata* Wahlenb. (*Paeomyces*)

A. *polyccephala* Wallr.

B. *heterodactyla* Wallr.



— *Clad. crispata* Ach.

1460

1460 sin.: tubaef. W. (polyceph.) Flot. D. L. 31 A.

1460 dext.: tub. heterodact. W.: Flot. D. L. 31 B.

Flot. siles. 1849 p. 41, (specimina originalia).



Herb. Floerke in Rostock.

- 1484 — *Cladonia symphy carpia* Fl. in Web. Mohr Beitr. 2, p.
281, Comm. p. 15.
(specim. orig.).
-



1486 — *Cladonia foliosa* Somft. in lit. ad Fl.; Fl. Comm. p. 71.
(specim. Sommerfeltii); comp. Arn. 1292.


Lenomyces gracilis
(?)
J. valida
floripara



Herb. Floerke in Rostock.

1487 — *Cladonia gracilis* L. f. *floripara* Fl. Comm. p. 36. (specim.
orig.)


P. valida
villosa



Herb. Floerke in Rostock.


1488 — *Cladonia gracilis* L, f. *dilacerata* Fl. Comm. p. 37. (specim.
orig.); comp. Arn. 1297.

D. salina
filicarpa



Herb. Floerke in Rostock.

1488 — *Cladonia gracilis* L, f. *dilacerata* Fl. Comm. p. 37. (specim.
orig.); comp. Arn. 1297.




Herb. Floerke in Rostock.

1489 — *Cladonia gracilis* L. f. *anthocephala* Fl. Comm. p. 37.
(specim. orig.)



1643. — *Cladonia Neozelandica* Wainio Mon. Clad. 2 p. 34.
Auf Erde in Neuseeland.

Knight.



7
STEVENSON MYCOLOGICAL LIBRARY
Smithsonian Institution

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01152 0814